| レジメン名 | エリブリン　軟部肉腫 |
|---|---|
| 対象がん種 | 軟部肉腫 |
| 使用診療科 | 腫瘍内科 |

| | |
|---|---|
| 1サイクルの日数 | * 21 日 |
| 通常使用サイクル数 | * 回 |
| インターバル日数 | 19 日 |

＊未記入可

| 薬品名（抗がん剤） | 略号 | 設定量① | 単位 | 上限量② | 単位 | 投与日（day） | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | day ( ) | day (1) | day ( ) | day (8) | day ( ) | day (15) | day ( ) | day ( 22) | day ( ) | day ( ) |
| エリブリン | | 1.4 | mg/m2 | | mg/body | | ○ | | ○ | | | | ○ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| レジメン名 | ドキソルビシン単剤75mg/m2_q3w_軟部肉腫 |
| 対象がん種 | 軟部肉腫 |
| 使用診療科 | 腫瘍内科 |

| | |
|---|---|
| 1サイクルの日数 | * 21 日 |
| 通常使用サイクル数 | * 回 |
| インターバル日数 | 19 日 |

＊未記入可

| 薬品名（抗がん剤） | 略号 | 設定量① | 単位 | 上限量② | 単位 | 投与日（day） | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | day ( ) | day (1) | day ( ) | day (22) | day ( ) | day (43) | day ( ) | day ( ) | day ( ) | day ( ) |
| ドキソルビシン | DXR | 75 | mg/m2 | 150 | mg/body | | ○ | | ○ | | ○ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| レジメン名 | トラベクテジン 軟部肉腫 |
| 対象がん種 | 軟部肉腫 |
| 使用診療科 | 腫瘍内科 |

| | |
|---|---|
| 1サイクルの日数 | * 21 日 |
| 通常使用サイクル数 | * 回 |
| インターバル日数 | 19 日 |

＊未記入可

| 薬品名（抗がん剤） | 略号 | 設定量① | 単位 | 上限量② | 単位 | 投与日（day） | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | day ( ) | day (1) | day ( ) | day (22) | day ( ) | day (43) | day ( ) | day ( ) | day ( ) | day ( ) |
| トラベクテジン | | 1.2 | mg/m2 | | mg/body | | ○ | | ○ | | ○ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |