レジメン名	Rituximab
対象がん種	リンパ腫
使用診療科	血液内科、化学療法科

1サイクルの日数	※ 21 日
通常使用サイクル数	※ 回
インターバル日数	7 日

※未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	限量②		投与日（day）									
						day ( )	day (1)	day ( )	day (22)	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )
リツキシマブ		375	mg/m2	750	mg/body		○		○						

レジメン名	CHOP
対象がん種	リンパ腫
使用診療科	血液内科、化学療法科

1サイクルの日数	※ 21 日
通常使用サイクル数	※ 回
インターバル日数	14 日

※未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	限量②		投与日（day）									
						day (1)	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )
エンドキサン	CPA	750	mg/m2			○									
オンコビン	VCR	1.4	mg/m2	2	mg/body	○									
アドリアシン	ADM	50	mg/m2			○									

レジメン名	R-CHOP
対象がん種	リンパ腫
使用診療科	血液内科、化学療法科

1サイクルの日数	※ 21 日
通常使用サイクル数	※ 回
インターバル日数	14 日

※未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	限量②		投与日（day）									
						day (1)	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )
リツキシマブ		375	mg/m2			○	○								
エンドキサン	CPA	750	mg/m2			○									
オンコビン	VCR	1.4	mg/m2	2	mg/body	○									
アドリアシン	ADM	50	mg/m2			○									

レジメン名	ABVD
対象がん種	ホジキンリンパ腫
使用診療科	血液内科、化学療法科

1サイクルの日数	※ 28 日
通常使用サイクル数	※ 回
インターバル日数	14 日

※未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	限量②		投与日（day）									
						day ( )	day (1)	day ( )	day (15)	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )
アドリアシン	ADM	25	mg/m2				○		○						
エクザール	VLB	6	mg/m2				○		○						
ブレオ	BLM	10	mg/m2				○		○						
ダカルバジン	DTIC	375	mg/m2				○		○						

レジメン名	Elotuzumab（サイクル1-2）
対象がん種	多発性骨髄腫
使用診療科	血液内科

1サイクルの日数	* 日
通常使用サイクル数	* 2 回
インターバル日数	28 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day（1）	2	8	9	15	16	22	23	day（）	day（）
エムプリシティ		10	mg/kg	1000	mg/body	○		○		○		○			

レジメン名	Elotuzumab（サイクル3以降）
対象がん種	多発性骨髄腫
使用診療科	血液内科

1サイクルの日数	* 日
通常使用サイクル数	* 2 回
インターバル日数	28 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day（1）	2	8	9	15	16	22	23	day（）	day（）
エムプリシティ		10	mg/kg	1000	mg/body	○				○					

レジメン名	ベルケイド皮下
対象がん種	多発性骨髄腫
使用診療科	**血液内科**

1サイクルの日数	* 日
通常使用サイクル数	* 8 回
インターバル日数	21 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day (1)	day (2)	day (4)	day (5)	day (8)	day (9)	day (11)	day (12)	day ( )	day ( )
ベルケイド		1.3	mg/m2			○		○		○		○			

レジメン名	ベルケイド皮下weekly
対象がん種	多発性骨髄腫
使用診療科	**血液内科**

1サイクルの日数	* 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	35 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day (1)	day (8)	day (15)	day (22)	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )
ベルケイド		1.3	mg/m2			○	○	○	○						

レジメン名	VRD
対象がん種	多発性骨髄腫
使用診療科	血液内科

1サイクルの日数	* 21 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	21 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day (1)	day (2)	day (4)	day (5)	day (8)	day (9)	day (11)	day (12)	day (14)	day ( )
ベルケイド	Bor	1.3	mg/m2			○		○		○		○			
レブラミド	Rev	25	mg/body			○	→	→	→	→	→	→	→	○	
デカドロン	Dex	20	mg/body			○	○	○	○	○	○	○	○		

レジメン名	VRD lite
対象がん種	多発性骨髄腫
使用診療科	血液内科

1サイクルの日数	*	35 日
通常使用サイクル数	*	9 回
インターバル日数		35 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day (1)	day (2)	day (8)	day (9)	day (15)	day (16)	day (21)	day (22)	day (23)	day ( )
ベルケイド	Bor	1.3	mg/m2			○		○		○			○		
レブラミド	Rev	15	mg/body			○	→	→	→	→	→	▶○			
デカドロン	Dex	20	mg/body			○	○	○	○	○	○		○	○	

レジメン名	VRD lite consolidation
対象がん種	多発性骨髄腫
使用診療科	血液内科

1サイクルの日数	*	28 日
通常使用サイクル数	*	6 回
インターバル日数		28 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day (1)	day (2)	day (8)	day (9)	day (15)	day (16)	day (21)	day (22)	day (23)	day ( )
ベルケイド	Bor	1.3	mg/m2			○				○					
レブラミド	Rev	15	mg/body			○	→	→	→	→	→	○			

レジメン名	Kd療法（サイクル1）
対象がん種	再発又は難治性の多発性骨髄腫
使用診療科	血液内科

1サイクルの日数	*	28 日
通常使用サイクル数	*	1 回
インターバル日数		28 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day（1）	2	8	9	15	16	21		day（）	day（）
カイプロリス		20	mg/m2	44	mg/body	○	○								
カイプロリス		56	mg/m2	123.2	mg/body			○	○	○	○				
デカドロン		20	mg/body			day1,2,8,9,15,16,22,23　内服									

レジメン名	Kd療法（サイクル2）
対象がん種	再発又は難治性の多発性骨髄腫
使用診療科	血液内科

1サイクルの日数	*	28 日
通常使用サイクル数	*	1 回
インターバル日数		28 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day（1）	2	8	9	15	16	21		day（）	day（）
カイプロリス		56	mg/m2	123.2	mg/body	○	○	○	○	○	○				
デカドロン		20	mg/body			day1,2,8,9,15,16,22,23 内服									

レジメン名	KRd療法（サイクル1）
対象がん種	多発性骨髄腫
使用診療科	血液内科

1サイクルの日数	*	28 日
通常使用サイクル数	*	1 回
インターバル日数		28 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day（1）	2	8	9	15	16	21		day（）	day（）
カイプロリス		20	mg/m2	44	mg/body	○	○								
カイプロリス		27	mg/m2	60	mg/body			○	○	○	○				
レブラミド		25	mg/body			day1～21　内服									
デカドロン		40	mg/body			day1,8,15,22　内服									

レジメン名	KRd療法（サイクル2-12）
対象がん種	多発性骨髄腫
使用診療科	血液内科

1サイクルの日数	* 日
通常使用サイクル数	* 11 回
インターバル日数	28 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day（1）	2	8	9	15	16			day（）	day（）
カイプロリス		27	mg/m2	60	mg/body	○	○	○	○	○	○				
レブラミド		25	mg/body			day1～21　内服									
デカドロン		40	mg/body			day1,8,15,22　内服									

レジメン名	KRd療法（サイクル13以降）
対象がん種	多発性骨髄腫
使用診療科	血液内科

1サイクルの日数	* 日
通常使用サイクル数	* 6 回
インターバル日数	28 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day（1）	2	8	9	15	16			day（）	day（）
カイプロリス		27	mg/m2	60	mg/body	○	○			○	○				
レブラミド		25	mg/body			day1～21　内服									
デカドロン		40	mg/body			day1,8,15,22　内服									

レジメン名	DLd（1-2サイクル）
対象がん種	多発性骨髄腫
使用診療科	血液内科

1サイクルの日数	* 日
通常使用サイクル数	* 2 回
インターバル日数	28 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day (1)	day (2)	day (8)	day (9)	day (15)	day (16)	day (21)	day (22)	day (23)	day ()
ダラザレックス	D	16	mg/kg			○		○		○			○		
レブラミド	L	25	mg/body	25	mg/body	○	←21日間連日→					○			
デキサメタゾン	d	20	mg/body			○	○	○	○	○	○		○	○	

レジメン名	DLd(3-6サイクル)
対象がん種	多発性骨髄腫
使用診療科	血液内科

1サイクルの日数	* 日
通常使用サイクル数	* 4 回
インターバル日数	28 日

＊未記入可

薬品名(抗がん剤)	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日(day)									
						day (1)	day (2)	day (8)	day (9)	day (15)	day (16)	day (21)	day (22)	day (23)	day ()
ダラザレックス	D	16	mg/kg			○				○					
レブラミド	L	25	mg/m2	25		○	←21日間連日→					○			
デキサメタゾン	d	20	mg/body			○	○			○	○				
デキサメタゾン	d	40	mg/body					○					○		
								d8-14 いずれか					d22-28 いずれか		

レジメン名	DLd(7サイクル-)
対象がん種	多発性骨髄腫
使用診療科	血液内科

1サイクルの日数	* 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	28 日

＊未記入可

薬品名(抗がん剤)	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日(day)									
						day (1)	day (2)	day (8)	day (9)	day (15)	day (16)	day (21)	day (22)	day (23)	day ()
ダラザレックス	D	16	mg/kg			○									
レブラミド	L	25		25		○	←21日間連日→					○			
デキサメタゾン	d	20	mg/body			○	○								
デキサメタゾン	d	40	mg/body					○		○			○		
								d8-14 いずれか		d15-21 いずれか			d22-28 いずれか		

レジメン名	モガムリズマブ_q1w_悪性リンパ腫
対象がん種	悪性リンパ腫
使用診療科	血液内科

1サイクルの日数	* 1 日
通常使用サイクル数	* 8 回
インターバル日数	7 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day (1)	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )
ポテリジオ		1	mg/kg			↓									

レジメン名	R-ベンダムスチン(90mg/m2)
対象がん種	低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫 マントル細胞リンパ腫
使用診療科	血液内科

1サイクルの日数	*	28 日
通常使用サイクル数	*	回
インターバル日数		28 日

＊未記入可

薬品名(抗がん剤)	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日(day)									
						day (1)	day (2)	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )
ベンダムスチン(トレアキシン)		90	mg/m2			○	○								
リツキシマブ		375	mg/m2			○									

レジメン名	ベンダムスチン_未治療
対象がん種	低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫 マントル細胞リンパ腫
使用診療科	血液内科

1サイクルの日数	* 28 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	28 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day (1)	day (2)	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )
ベンダムスチン（トレアキシン）		90	mg/m2			○	○								

レジメン名	アドセトリス
対象がん種	Hodgkinリンパ腫・CD30陽性ALCL
使用診療科	血液内科

1サイクルの日数	*	21 日
通常使用サイクル数	*	16 回
インターバル日数		19 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day (1)	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )	day ( )
アドセトリス	ADC	1.8	mg/kg			○									

レジメン名	アザシチジン_q4w_MDS
対象がん種	骨髄異形成症候群
使用診療科	血液内科

1サイクルの日数	* 日
通常使用サイクル数	* 回
インターバル日数	28 日

＊未記入可

薬品名（抗がん剤）	略号	設定量①	単位	上限量②	単位	投与日（day）									
						day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)	day ( )	day ( )	day ( )
アザシチジン(ﾋﾞﾀﾞｰｻﾞ)		75	mg/m2			○	○	○	○	○	○	○			