

レジメン名	FOLFOX+Cmab_q2w_大腸がん
対象がん種	大腸
使用診療科	腫瘍内科

1サイクルの日数※	14日
通常使用サイクル数※	回
インターバル日数	12日

※未記入可

薬品名(抗がん剤)	略号	設定量 ^①	単位	限量 ^②	投与日(day)												
					day (1)	day (8)	day (15)	day (22)	day (29)	day (36)	day (0)	day (0)	day (0)	day (0)			
5-FU	FU	2400	mg/m ²		○		○		○								
5-FU	FU	400	mg/m ²		○		○		○								
レボホリナート	LV	200	mg/m ²		○		○		○								
エルプラット	L-OHP	85	mg/m ²		○		○		○								
アービタックス(初回)	Cmab	400	mg/m ²		○												
アービタックス(維持)	Cmab	250	mg/m ²			○	○	○	○	○							

レジメン名	FOLFIRI+Cmab_q2w_大腸がん
対象がん種	大腸
使用診療科	腫瘍内科

1サイクルの日数※	日
通常使用サイクル数※	回
インターバル日数	14日

※未記入可

薬品名(抗がん剤)	略号	設定量 ^①	単位	限量 ^②	投与日(day)												
					day (1)	day (8)	day (15)	day (22)	day (29)	day (36)	day (0)	day (0)	day (0)	day (0)			
5-FU	FU	2400	mg/m ²		○		○		○								
5-FU	FU	400	mg/m ²		○		○		○								
レボホリナート	LV	200	mg/m ²		○		○		○								
イリノテカン	CPT	180	mg/m ²		○		○		○								
アービタックス	Cmab	400	mg/m ²		○												
アービタックス	Cmab	250	mg/m ²			○	○	○	○	○							

